

Внимание!

В срок исполнения заказа **не включается** день взятия биоматериала.

Приём и взятие мочи и венозной крови на исследования:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (с 8.00 до 12.00), суббота (с 9.00 до 13.00).

1. Кровь рекомендуется сдавать утром, натощак после 8 – 10 часового ночного периода голодания. Если у пациента нет возможности прийти в процедурный кабинет утром (с 08.00 до 10.00), кровь на лабораторные исследования (за исключением ряда показателей - АКТГ, СТГ, кортизол, паратгормон, альдостерон, ренин, ТТГ, холестерин, холестерин – ЛПВП, холестерин – ЛПНП, триглицериды, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, липопротеин (а) можно сдавать и в другое время, но обязательным условием является перерыв не менее 6 часов после последнего приёма пищи. Пить можно только воду (чай с сахаром, кофе, сок влияют на результат исследования)!
2. Общий анализ крови можно сдавать через 4 часа после последнего приёма пищи.
3. Желательно за 1 – 2 дня до исследования исключить из рациона питания жирную, жареную пищу и алкоголь.
4. Кровь на исследование необходимо сдавать до начала приема лекарственных препаратов (например, антибактериальных и химиотерапевтических) или не ранее чем через 10 - 14 дней после их отмены. Исключение составляют случаи, когда хотят исследовать концентрацию лекарств. Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача!
5. Кровь нельзя сдавать после рентгенографии, УЗИ - исследования, ректального исследования или физиотерапевтических процедур.
6. На результаты исследований гормонов репродуктивной системы у женщин влияют физиологические факторы, связанные с фазой менструального цикла. Поэтому в

направлении на исследование гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстриол свободный, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, 17-оксипрогестерон) следует указать фазу цикла, для беременных срок беременности. При проведении исследования на половые гормоны строго придерживайтесь рекомендаций вашего лечащего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдать кровь!

7. При подозрении на какое-либо инфекционное заболевание проводится исследование на наличие антител. В данном случае следует помнить, что в зависимости от периода инфицирования и состояния иммунной системы у любого пациента может быть отрицательный результат. Однако отрицательный результат полностью не исключает инфекции. В сомнительных случаях рекомендуется провести повторное исследование через 2 – 3 недели.

8. Перед взятием крови на исследование нужно исключить физические нагрузки (бег, подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение. Поэтому перед процедурой следует отдохнуть 10 - 15 минут в приемной и успокоиться.

9. За 1 час до взятия крови не курить!

Взятие крови из вены

Наименование процедуры

Цены

Взятие крови из вены в одну пробирку

450 тенге

Взятие крови из вены в две пробирки

600 тенге

Взятие крови из вены в три пробирки

750 тенге

Взятие крови из вены в четыре пробирки

900 тенге

Взятие крови из вены в пять пробирок

1050 тенге

Взятие крови из вены в шесть пробирок

1200 тенге

Взятие крови с выездом на дом

2000 тенге